



جمهوری اسلامی ایران

نسخه بهداشتی وزارت بهداشت

معاونت بهداشت

مرکز مدیریت بیماری های واگیر

اداره مراقبت

لیست بیماری ها و سندرم های واگیر تحت مراقبت در جمهوری اسلامی ایران

SURVEILLANCE OF COMMUNICABLE DISEASES AND SYNDROMES IN I.R.A.N

در صورت مشاهده هر یک از بیماری های واگیر و یا سندرمهای تحت مراقبت، به واحد بهداشتی تعیین شده

(مرکز بهداشت شهرستان / کارشناس کنترل عفونت بیمارستان) گزارش گردد.

الف: لیست بیماری های عمده تحت مراقبت ROUTINE SURVEILLANCE

گزارش آبی و بلافاصله (کمتر از ۶ ساعت):
هاری - آنفلوآنزای پرندگان - تولاژمی - طاعون - وبا -
سیاه زخم تنفسی - بوتولیسم - زیکا - چیکونگونیا -
ایبولا - تب های خونریزی دهنده - کرونا - تیفوئید
مقاوم به درمان - هر گونه افزایش ناگهانی موارد بیمار بها
(طغیان یا اپیدمی)

گزارش فوری (در کمتر از ۲۴ ساعت):
فلج شل حاد - تب و بثورات حاد جلدی ماکولوپاپولر - سل ریوی
- سیاه سرفه - دیفتری - کزاز - سندرم سرخچه مادرزادی -
مننژیت - مالاریا - اسهال خونی - تب دنگی - تب راجعه - تب
زرد - جذام - سیاه زخم جلدی - کزاز بالغین - شیستوزومیازیس
یستری در بیمارستان بدنبال واکسیناسیون

گزارش هفتگی (معمول):
سایر انواع سل (بجز سل ریوی) - انواع هپاتیت های ویروسی
- تیفوئید - بروسلاز - ایشمانیوز جلدی (سالم) - ویشمانیوز
احشایی (کالا آزار) - شیکلوزیس - سفلیس - سوزاک
- HIV/AIDS - کیست هیداتیک - توکسوپلاسموزیس -
فاسیولیاژیس - لیتوسپیروزیس - پدیکیلوزیس و کال

ب- لیست سندرم های واگیر تحت مراقبت (مشمول گزارش فوری) SYNDROMIC SURVEILLANCE

۱- سندرم فلج شل حاد :
ACUTE FLACCID PARALYSIS
SYNDROME
تعریف: فلج شل ناگهانی
یعنی عدم حرکت پا و یا دست
بدون سابقه ترومای (ضربه) واضح
جسمانی در سن زیر ۱۵ سال و
یا در هر سنی به شرط مشکوک
شدن پزشک به فلج اطفال
مهم ترین تشخیص افتراقی:
فلج اطفال - گیلن باره - مننژیت
- انسفالیت - میلیت عرشی -
آرتریت - میوزیت - مینوویت
- انواع مسمومیت - گزش
حیوانات و حشرات سمی -
عوارض واکسیناسیون

۲- سندرم تب و خونریزی (بدون تروما):
FEVER WITH HEMORRHAGIC MANIFESTATION SYNDROME
تعریف: تب بیش از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل دو علامت از
علائم زیر (خونریزی ناشی از تروما فاشد):
۱. خونریزی پوست به صورت کبودی (اکیموز)
۲. خونریزی نقطه نقطه (پتشی) در پوست
۳. خونریزی دستگاه تنفس فوقانی (خونریزی از لثه یا بینی)
۴. خونریزی دستگاه تنفس تحتانی (خلط خونی)
۵. خونریزی دستگاه گوارش (استفراغ و مدفوع خونی، مدفوع سیاه)
۶. خونریزی دستگاه ادراری (ادرار خونی)
۷. خونریزی دستگاه تناسلی (خونریزی غیرطبیعی زنانه)
مهم ترین تشخیص های افتراقی:
CCHF (تب خونریزی دهنده کریمه کنگو) - مننگوکوکسمی - تیفوئید
- تب دنگی - تب زرد - ایبولا - چیکونگونیا - سرخک - مالاریای
شدید - لیتوسپیروز - سپتی سمی

۳- سندرم تب و راش (بثورات) حاد جلدی :
FEVER AND ACUTE RASH SYNDROME
تعریف: تب بیش از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علائم زیر به صورت منتشر:
۱. لکه های کوچک و همسطح غیر همرنگ با پوست (ماکول) معمولاً به صورت منتشر
۲. دانه های کوچک و برجسته غیر همرنگ با پوست (پاپول) معمولاً به صورت منتشر
الف: تب و راش حاد ماکولوپاپولر مهم ترین تشخیص های افتراقی: سرخک - سرخچه - مننگوکوکسمی
- منونگلوکز عفونی - CCHF - چیکونگونیا - تب دنگی - سفلیس - تیفوس - تیفوئید - راش دارویی - گزش
حشرات
تعریف: تب بالاتر از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علائم زیر:
۱. دانه یا دانه های کوچک، برجسته و آبدار در پوست (وزیکول)
۲. برجستگی های بزرگ پوستی حاوی مایع غیر چرکی (تاول) یا مایع چرکی (پوستول)
۳. بثورات فاقد پوست ازخمهای بدون ضربه یا بریدگی
۴. حال عمومی بد
ب- تب و راش حاد غیر ماکولوپاپولر: مهم ترین تشخیص های افتراقی: آبله - آبله مرغان - سیاه
زخم - تولاژمی - ایشمانیوز جلدی (سالم) - کال

۴- سندرم شبه آنفلوآنزا (ILI)
INFLUENZA-LIKE
ILLNESSES SYNDROME
تعریف: تب به همراه سرفه ای که
در طی یک هفته اخیر رخ داده
باشد.
مهم ترین تشخیص های افتراقی:
آنفلوآنزا - پاراآنفلوآنزا - سیاه
سرفه - کرونا - سارس

۵- سندرم عفونت شدید حاد تنفسی
SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS/ILLNESS
SYNDROME (SARI)
تعریف: بروز تب و سرفه در طول یک هفته اخیر به همراه حداقل یکی
از علائم زیر:
۱. در سیستم تنفسی (تأکی پنه «تنفس تند»، فرو رفتگی عضلات بین دنده ای در
حین تنفس، تنفس صداهار، خلط خونی)
۲. در سیستم قلبی عروقی (درد قفسه سینه، افت شدید فشار خون، اختلال ریتم)
۳. در سیستم عصبی (گشش سطح هوشیاری، تشنج)
مهم ترین تشخیص های افتراقی: آنفلوآنزا - کرونا - سل - سیاه سرفه - دیفتری -
سرخک - سیاه زخم - تولاژمی - طاعون

۶- سندرم سرفه مزمن
CHRONIC COUGH
SYNDROME
تعریف: سرفه پایدار به
مدت دو هفته یا بیشتر
که معمولاً همراه با
خلط می باشد.
مهم ترین تشخیص
افتراقی: سل

۷- سندرم مسمومیت غذایی:
FOOD INTOXICATION SYNDROME
تعریف: بروز علائم زیر شامل بند ۱ یا ۲:
۱. تهوع و استفراغ بعد از مصرف مواد غذایی یا آشامیدنی
۲. شکم درد (دل پیچه) بعد از مصرف مواد غذایی یا آشامیدنی
مهم ترین تشخیص های افتراقی: مسمومیت با عوامل شیمیایی -
مسمومیت با عوامل باکتریایی، ویروسی، قارچی، انگلی - مسمومیت
با فلزات سنگین - مسمومیت با سموم - تب مالت - مسمومیت با الکل

۸- سندرم اسهال خونی حاد غیر خونی
ACUTE DIARRHEA (NON-
BLOODY) SYNDROME
تعریف: اسهال حاد (غیرخونی)
یعنی دفع حداقل ۳ بار مدفوع
شل در ۲۴ ساعت به علاوه: تهوع و
استفراغ یا شکم درد (دل پیچه)
مهم ترین تشخیص های افتراقی:
اسهال های ناشی از عوامل میکروبی،
ویروسی، پارازیتی - وبا - تب مالت - عوامل
شیمیایی

۹- سندرم اسهال خونی
BLOODY DIARRHEA
SYNDROME
تعریف: اسهال خونی (وجود
خون روشن در مدفوع
اسهالی) یا یا بدون تهوع و
استفراغ یا شکم درد (دل
پیچه)
مهم ترین تشخیص های
افتراقی: شیکلوز - آمیبیاز
- سالمونلوز - فلزات سنگین -
سیاه زخم - انواع دیگر وبا

۱۰- سندرم زردی حاد
ACUTE JAUNDICE SYNDROME
تعریف: زردی در سفیدی
چشم - یا زردی زیر زبان یا
زردی خست وسط شکم
مهم ترین تشخیص های
افتراقی: انسداد هپاتیت -
مالاریای شدید - لیتوسپیروز -
مالاریای شدید - فاسیولیاژیس
- مسمومیت های شیمیایی -
مسمومیت های قارچی

۱۱- سندرم تب و علائم نورولوژیک (علائم عصبی)
FEVER AND NEUROLOGICAL SYMPTOMS SYNDROME
تعریف: بروز تب ناگهانی بالای ۳۸ درجه دهانی به
همراه حداقل یکی از علائم زیر:
علائم اصلی: سفنی گردن (سختی حرکات گردن) -
تشنج - کاهش هوشیاری - تحریک پذیری
علائم کمکی: سردرد شدید - استفراغ
مهم ترین تشخیص های افتراقی: انواع مننژیت - انواع
انسفالیت - آنفلوآنزا - آبله مرغان - هاری - مالاریای
مغزی - سیاه زخم - طاعون - مسمومیت با سرب،
جیوه، ارگانوفسفره، حلال های صنعتی

۱۲- سندرم تب طول کشیده
PROLONGED FEVER SYNDROME
تعریف: داشتن تب بیش از ۳ روز
به همراه یکی از علائم سردرد خفیف،
درد عضلات، کوفتگی بدن و حال
عمومی بد.
مهم ترین تشخیص های افتراقی: سل - مالاریا
- بروسلاز - تیفوئید - بوریلیوز - لیتوسپیروز -
تب دنگی - ایشمانیوز احشایی (کالا آزار) - تب
کیو - انواع هپاتیت - HIV/AIDS

۱۳- سندرم شوک عفونی
SEPTIC SHOCK SYNDROME
تعریف: بیمار بدحال با شواهد یک عفونت موضعی یا سیستمیک (به عنوان مثال رویت ترشح چرکی)
با احتمال (استعداد) عفونت مثل نقص ایمنی، سوختگی، ... به علاوه حداقل ۲ علامت از ۳ علامت حیاتی
ذیل:
۱. تاکی پنه (تنفس تندتر از حد نرمال)
۲. تاکی کاردی (ضربان قلب بیشتر از حد نرمال)
۳. داشتن درجه حرارت کمتر از ۳۶ درجه سانتی گراد (هایپوترمی) یا داشتن تب بالای ۳۸ درجه
سانتیگراد (هایپرترمی)
مهم ترین تشخیص های افتراقی: مننگوکوکسمی - تیفوئید - بروسلاز - طاعون - آنفلوآنزا - کرونا -
سارس - مالاریا - وبا خشک - تب های خونریزی دهنده - سیاه زخم
علائم کمکی:
۱. اختلال عملکرد ارگانهای دور از محل عفونت (بدلیل هیپوپرفیوژن و بروز ایسکمی)
۲. افت فشار خون که با تجویز مقدار کافی مایعات مناسب مثل نرمال سالین، رینگر لاکتات قابل برگشت باشد.
۳. ایسکمی پوست: پرشدگی خون مویرگی بیشتر از ۳ ثانیه یا رنگ پریدگی پوست (در کودکان) (پس
از برداشتن فشار انگشت از روی پوست، برگشت رنگ به پوست به حالت اولیه، بیشتر از ۳ ثانیه طول
بکشد).
۴. اختلال عملکرد کلیه: (اولیگوری)
۵. اختلال عملکرد مغز: بیقراری، خواب آلودگی، کما (تغییر سطح هوشیاری)
۶. اختلال عملکرد ریه: تنگی نفس، کبودی مخاط ها و انتهاها
۷. سردی انتهای اندامها (گاهی و در مراحل پیشرفته)

۱۴- سندرم مرگ ناگهانی و غیرمنتظره (مرگ مشکوک)
SUDDEN DEATH AND UNEXPECTED SYNDROME
تعریف: مرگی که فاصله بین شروع علائم و وقوع مرگ کمتر از ۲۴
ساعت باشد و علت بیماریهای داخلی، تروما، قتل و موارد مشابه
نباشد و علائم پوستی از قبیل پتشی، پورپورا، اکیموز، خونریزی
در فرد مشاهده می شود:
۱. توقف نبض و تنفس بمدت بیش از ۱۰ دقیقه در فاصله کمتر از
۲۴ ساعت از شروع علائم بیماری
۲. مرگ غیرمنتظره (مرگ ناگهانی) که با دلایلی مانند کپولت سن،
بیماری مزمن و یا حوادث (تروماها) که مرگ را قابل توجیه
می کنند، ارتباط نداشته باشد
۳. فاصله بین شروع علائم و وقوع مرگ کمتر از ۲۴ ساعت
مهم ترین تشخیص های افتراقی: انسفالیت - مننژیت - عفونتهای
شدید - وبا - طاعون - مسمومیت های شدید - مارگزیدگی -
مصرف الکل و مواد مخدر

۱۵- سندرم تب و تورم غدد لنفاوی
FEVER AND
LYMPHADENOPATHY
SYNDROME
تعریف: بروز تب به همراه تورم
حاد غدد لنفاوی / گردن / زیر بغل /
کشاله ران : (تب بیشتر از ۳۸
درجه دهانی به همراه حداقل یکی
از علائم زیر: بزرگی غدد لنفاوی /
درد غدد لنفاوی / التهاب غدد
لنفاوی)
مهم ترین تشخیص های
افتراقی: طاعون - تولاژمی

۱۶- سندرم بیماری های آمیزشی
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES SYNDROME
تعریف: وجود هر یک از علائم زیر:
* در نوزادان: ترشح چشمی «در خانم ها: درد زیر شکم - ترشح واژینال
* در آقایان: تورم بیضه - ترشح مجرا «زخم یا زگیل تناسلی - التهاب مقعد - تورم اینگوینال
مهمترین تشخیص های افتراقی: سوزاک - سفلیس - زگیل تناسلی - شانکروئید

شماره تلفن واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ۳۴۵۲۰۲۸۳ - (۳۴۵۳۳۱۰۰ شبانه روزی)